

OPAS APTEEKKIHENKILÖKUNNALLE

Ventizolve® (naloksoni) 1,26 mg nenäsumute, liuos, kerta-annospakkaus

1) Yleisiä tietoja apteekkihenkilökunnalle

Ventizolve on tarkoitettu tiedossa olevan tai epäillyn opioidiylännostuksen akuuttiin hoitoon, joka ilmenee hengitys- ja/tai keskushermoston lamana, sekä terveydenhuollossa että sen ulkopuolella.

Ventizolve ei korvaa ensihoitoa.

Ventizolve on tarkoitettu vain aikuisille.

Yhden Ventizolve-pakkauksen sisältö:

- Yksi muovikotelo sisältää kaksi nenäsumutetta. Toinen sumute on tarkoitettu toisen naloksoniannoksen antamiseen tarvittaessa.
- Muovikotelossa on pikaopas. Sen piktogrammit kuvaavat, miten Ventizolve-valmistetta käytetään.
- Pakkausselosteessa on tietoa lääkevalmisteesta ja vaiheittaiset käyttöohjeet.

2) Ventizolve-valmisteen toimittamiseen liittyvät ehdot

Ventizolve on tarkoitettu toimitettavaksi potilaille, joilla on opioidiylännostuksen riski, sekä heistä huolehtiville henkilöille (esim. ystäville ja perheenjäsenille).

3) Asiakkaalle ennen lääkkeen toimittamista annettavat tiedot

- Kerro asiakkaalle, miten **ohjevideo** on **saatavissa**. Videossa esitetään Ventizolve-valmisteen käyttöohjeet. Kerro, että valmisteen ulkopakkauksessa ja pakkausselosteessa on QR-koodi ja verkko-osoite (www.ventizolve.com).
- Kehota tutustumaan videossa ja pakkausselosteessa annettuihin ohjeisiin siitä, miten epäillyn opioidiylännostuksen yhteydessä **on toimittava**.
- Asiakkaasta huolehtivan henkilön ymmärtävän, että on tärkeää aina **ensin hälyttää paikalle ambulanssi/ensihoito**.
Soita 112.

- Varmista, että asiakas huolehtiva henkilö osaa **käyttää** Ventizolve-valmistetta **oikein. Ventizolve ei korvaa ensihoitoa.**
Sumutetta **ei saa esivalmistella eikä testata** ennen käyttöä.
Kun suutin on sieraimessa, sumutin aktivoidaan painamalla mäntää, kunnes kuuluu naksahdus.
- Opastuksessa on mainittava, että Ventizolve-valmisteen antavan henkilön on **pysyttävä potilaan luona, kunnes ambulanssi/ensihoito saapuu.** Kehota tutustumaan ohjevideossa ja pakkausselosteessa annettuihin tietoihin.
- Varmista, että asiakas on tietoinen siitä, että hengityslama voi uusiutua. Jos merkittävää kliinistä vaikutusta ei saada tai jos vointi huononee alkuvaiheen hoidon jälkeen, 2–3 minuutin kuluttua voidaan antaa yksi **lisäannos.**
- Kerro asiakkaalle, että **opioidien vieroitusoireet** ovat mahdollisia opioideista fyysisesti riippuvaisilla henkilöillä. Jotkut henkilöt voivat herätessään käyttäytyä aggressiivisesti.
- Mikäli Ventizolvea ostava asiakas on käyttänyt valmistetta aikaisemmin ja käyttö on hänelle tuttua, edellä luetellut asiat voidaan käsitellä tapauskohtaisesti tiivistetympin.